

## Jungvolkbildung Zeitplan

<b>Tag</b> (X = Umlarv- tag)	<b>einfacher Brutableger mit integrierter          Königinaufzucht</b>
<b>- 4 vor X</b>	<b>Absperrgitter</b> in Spendervölker <b>einlegen</b> / oder <b>Brutwaben</b> ohne Bienen(Königin) in den Honigraum <b>umhängen</b>
(-1 vor X)	Sofern noch nicht geschehen: Brutwaben ohne Bienen(Königin) in den Honigraum umhängen
<b>X</b>	<b>Ableger bilden</b> je Ableger 2-3 Zellen umlarven und am Rand des Brutnests in die Wabe drücken

	(am besten bei der Bildung jedoch spätestens 2 Stunden nach der Bildung, VOR Weiselunruhe)
<b>X + 5</b>	<b>Annahmekontrolle umgelarvter Zellen überzählige Zellen auf andere Ableger verteilen, Nachschaffungszellen brechen</b>
<b>X + 14</b>	<b>Schlupfkontrolle, (Schlupf der Königin X+12)</b>
<b>X + 24 (bis + 28)</b>	<b>Eilagekontrolle Varroabehandlung mit Milchsäure sprühen</b>
	<b>füttern und erweitern</b>
<b>Mitte August</b>	<b>Varroakontrolle, ggfs. Varroabehandlung mit Ameisensäure</b>