

Tabelle 8. Anbau- und Ertragseigenschaften Sommerhafer, LSV 2018, nach Beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes.

Sorte	Züchter / Vertreiber	Spelzenfar+B3+C2:T13	Rispenstieben	Reife	Reifeverzögerung Stroh	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für Mehltau	Ertragseigenschaften					Qualität				
							Lager	Halmknicken		Bestandesdichte	Kornzahl/Rispe	Tausendkornmasse	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Sortierung > 2,0 mm	Sortierung > 2,5 mm	Hektolitergewicht	Spelzenanteil	Anteil nicht entspelzter Körner
Max VRS	SZ Bauer / IG	g	4	5	4	4	7	6	5	5	6	5	5	5	8	6	7	2	4
Symphony VRS	Nordsaat / SU	w	5	5	5	6	4	5	5	4	6	7	6	6	9	8	6	3	5
Poseidon VGL	Nordsaat / SU	g	5	5	6	5	4	4	5	4	6	7	6	6	9	8	5	3	4
Apollon	Nordsaat / SU	g	4	5	6	6	4	4	6	4	4	8	6	6	9	9	6	3	2
Bison	Nordsaat / Hauptsäaten	g	3	5	6	4	2	3	1	5	3	8	5	4	9	9	6	3	3
Yukon	Nordsaat / DSV	g	5	5	6	5	4	4	1	4	6	6	6	6	8	7	6	4	4
Troll (Kurzstroh)	SZ Bauer / IG	g	5	5	5	1	1	3	4	5	6	4	6	5	8	6	5	4	2
Harmony VRS	Nordsaat / SU	w	4	5	5	5	4	4	1	4	4	9	6	5	9	8	6	2	4
Delfin	Nordsaat / Hauptsäaten	g	5	5	7	5	4	4	1	5	5	8	7	7	8	6	6	3	4
Armani VGL	SZ Bauer / IG	g	5	5	5	3	4	4	2	6	5	6	7	7	8	7	4	2	2

1-9: Boniturnoten des BSA (1 = sehr gering, kurz, früh; 9 = sehr hoch, lang, spät)

grün hinterlegte Zellen: positiv zu bewertende Merkmalsausprägung; orange hinterlegte Zellen: negativ zu bewertende Merkmalsausprägung

Spelzenfarbe: g (gelb), w (weiß); VRS: Verrechnungssorte, VGL: Vergleichssorte.